



薬局通信 第100号



大阪母子医療センター

新規試用または採用、採用区分が変更になった医薬品一覧

新規試用医薬品	患者限定医薬品	院外専用医薬品
ベリプラストPコンビセット 組織接着用 1mL デキストロメトルフアン臭化水素 酸塩錠 15mg 「NP」	ドキシソルピシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」 ビーリンサイト点滴静注用 35 μg パナルジン細粒 10% ウログラフィン注 60% 20mL イラリス皮下注射液 150mg サンリズムカプセル 25mg ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 オルベスコ 100 μg インヘラー 112 吸入用 オルベスコ 200 μg インヘラー 56 吸入用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 ヒルドイドソフト軟膏 0.3% 100g アラミスト点鼻液 27.5 μg 120 噴霧用 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 100g、200g ホスレノールOD錠 250mg ピバンセカプセル 20mg、30mg ピドキサール錠 30mg ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 カプトリル細粒 5% アレジオンLX点眼液 0.1% アジマイシン点眼液 1%
新規採用医薬品		採用中止医薬品
レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL バッグ 5,000mL バッグ レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL バッグ 5,000mL バッグ レギュニール LCa 4.25 腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,000mL バッグ レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液 UV ツインバッグ 2,000mL バッグ レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液 UV ツインバッグ 2,000mL バッグ	エクストラニール腹膜透析液 ツインバッグ 2,000mL バッグ フィブラストスプレー500 (トラフェルミン) 過塩素酸カリウム (過塩素酸カリウム) イノラス配合経腸用液 (ヨーグルト) ミティキュアダニ舌下錠 3,300JAU シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU ロラピタ静注 2mg 向精神薬 ピムパット点滴静注 200mg ワイスターール配合静注用 0.5g、1.0g 硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	バルトレックス顆粒 50% サムスカ錠 15mg スルペラゾン静注用 0.5g、1g フランドルテープ 40mg メジコン配合シロップ

採用薬品の処方開始は、原則として **2020年5月7日** からとなります。

ただし、採用中止薬、切り替え等は院内在庫薬がなくなり次第実施となりますので開始日が異なる場合があります。

薬事委員会からのお知らせ

・販売中止などにより変更した医薬品

院内採用削除薬	変更理由	当院採用薬での代替薬など
バルトレックス顆粒 50%	期限切れ廃棄	バラシクロビル錠 500mg アストリックドライシロップ 80%
乾燥弱毒生風しんワクチン	販売中止	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン (ミールピック)
サムスカ錠 15mg	販売中止	サムスカ顆粒 1%

・後発薬へ切り替え予定の医薬品

削除不可薬品	後発薬
スルペラゾン静注用 0.5g、1g	ワイスタール配合静注用 0.5g、1g
フランドルテープ 40mg	硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」
メジコン配合シロップ	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg 「NP」

・2019年度不働医薬品の整理についてのアンケート結果により採用削除になった医薬品

薬剤名	
アドリアシン注用 10	ケイツーカプセル 5mg
注射用アナクト C2500 単位	コペガス錠 200mg
注射用エラスポール 100	ピタメジン配合カプセル B25
コアテック注 5mg	ブイフェンド錠 50mg
パズクロス点滴静注液 300mg、500mg	フロリードゲル経口用 2%
アクトス錠 15mg	ボナロン経口ゼリー 35mg
MS コンチン錠 10mg、30mg	マグコロール液
エリスロシン錠 100mg	ユリノーム錠 25mg
クラシエ猪苓湯エキス細粒	アクロマイシン軟膏 3%
クレメジンカプセル 200mg	リレンザ

新規試用医薬品

① ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL 特定生物由来製品・処方箋医薬品

(CSL ベーリング株式会社) 血漿分画製剤 (生理的組織接着剤)

一般名：フィブリノゲン加第XIII因子

※本剤は、必要時購入薬であるため、使用前に薬局へ連絡が必要です。

採用理由

神経移行術・移植術は、顕微鏡下において短時間で固定する必要があるため、これまで使用していたボルヒールに比べ、本剤は薬剤粘度が高く、凝固までの時間がやや短いため。

効能効果

組織の接着・閉鎖 (ただし、縫合あるいは接合した組織から血液、体液または体内ガスの漏出をきたし、他に適切な処置法のない場合に限る。)

用法用量

フィブリノゲン末 (バイアル 1) をアプロチニン液 (バイアル 2) 全量で溶解し、A 液とする。トロンビン末 (バイアル 3) を、アプロチニン液量と同量の塩化カルシウム液 (バイアル 4) で溶解し、B 液とする。接着・閉鎖部位に A 液、B 液を重層または混合して適用する。

通常、10cm²あたり A 液 B 液各々1mL を適用する。なお、接着・閉鎖部位の状態、大きさに応じ適宜増減する。

処方区分：院内処方可

長期投与の可否：該当しない

薬価：12,081.¹円/組

② デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg 「NP」 処方箋医薬品

(ニプロ) 鎮咳剤

一般名：デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

採用理由

本剤は、妊娠期の第一選択薬。同効薬のコデインリン酸塩は、分娩直前まで常習的に使用した場合、出生後に新生児離脱症状群を引き起こす可能性が示されており、使用しづらいため。

効能効果

1. 下記疾患に伴う咳嗽

感冒、急性気管支炎、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺炎、肺結核、上気道炎 (咽喉頭炎、鼻カタル)

2. 気管支造影術及び気管支鏡検査時の咳嗽

用法用量

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物として、通常、成人 1 回 15～30mg を 1 日 1～4 回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

処方区分：院内・院外処方可

長期投与の可否：該当しない

薬価：5.⁷円/錠