



薬局通信 第106号



大阪母子医療センター

新規試用または採用、採用区分が変更になった医薬品一覧

新規試用医薬品	新規採用医薬品	新規患者限定医薬品
①ロラタジンドライシロップ 1%「NP」	①ロタリックス内用液 ②メブチン錠 50 μ g	①ルネスタ錠 1mg ②アトモキセチン錠「ト-」5mg・10mg ③弘治柴胡桂枝湯I7顆粒(医療用) ④チラーチンS 静注液 200 μ g ⑤カプトリル細粒 5%
新規院外専用医薬品	採用中止医薬品	
①モビコール配合内用剤 LD ②ロラタジンドライシロップ 1%「NP」 ③コムクロシャンパー0.05% ④ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) ⑤ドプス OD 錠 100mg ⑥アフィニール分散錠 3mg ⑦ワコピタール坐剤 100 ⑧アムロジン OD 錠 2.5mg ⑨リフキシマ錠 200mg ⑩フィアスブ注フレックスタッチ ⑪アザルフィジン EN 錠 500mg	【不動薬】 ①マイスタン錠 10mg ②硫酸マグネシウム(内服薬)	

採用薬品の処方開始は、原則として **2021年5月11日(火)** からなります。

ただし、採用中止薬、切り替え等は院内在庫薬がなくなり次第実施となりますので開始日が異なる場合があります。

新規試用医薬品

① ロラタジンドライシロップ 1%「NP」 処方箋医薬品

(ニプロ株式会社) 持続性選択 H1 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

一般名：ロラタジン

採用理由

エピナスチンが自主回収により使用不可になったため。

効能効果

アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒

用法用量

成人

通常、ロラタジンとして 1 回 10mg（ドライシロップとして 1g）を 1 日 1 回、食後に用時溶解して経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。

小児

通常、3 歳以上 7 歳未満の小児にはロラタジンとして 1 回 5mg（ドライシロップとして 0.5g）、7 歳以上の小児にはロラタジンとして 1 回 10mg（ドライシロップとして 1g）を 1 日 1 回、食後に用時溶解して経口投与する。

処方区分：院内・院外処方可

長期投与の可否：可

薬価：48.⁹⁰円/g