



薬局通信

第99号



大阪母子医療センター

掲載薬品一覧

新規試用品目	患者限定医薬品	院外専用医薬品
ルセンチス硝子体内注射液 10m g/mL	ストラテラ内用液0.4%	ナウゼリンOD錠10m g
ボルヒール組織接着用5mL	デパケン錠100m g、200m g	マヴィレット配合錠
KN1号輸液500m L	センノサイド顆粒8%「EMEC」	ツムラ帰脾湯エキス顆粒 2.5 g/包
ベオーバ錠50m g	モサプリドクエン酸塩錠5m g 「ファイザー」	
カーバグル分散錠200m g	ヒドロクロロチアジド錠25m g 「トーワ」	採用中止薬
トコフェロール酢酸エステル 顆粒20%「ツルハラ」	アサコール錠400m g	ユベラN細粒40%
リティンパ耳科用250μ gセット	シチコリン注250m g/2m L 「日医工」	ユベラ顆粒20%
	ムコスタ点眼液UD2%	

採用薬品の処方開始は、原則として2020年3月2日からとなります。

ただし、採用中止薬、切り替え等は院内在庫薬がなくなり次第実施となりますので開始日が異なる場合があります。

薬事委員会からのお知らせ

・その他の削除薬

院内採用削除薬	当院採用薬での代替薬など	削除理由
ロコルナール細粒 10%	ジピリダモール散 12.5%	販売中止
ユベラ N 細粒 40%、 ユベラ顆粒 20%	トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」	販売中止
アクリノール 0.1% 「マルイシ」	各種消毒薬	販売中止
メタライト 250 カプセル	なし	期限切れ廃棄
キシロカイン注ポリアンプ 2%5mL	キシロカイン注ポリアンプ 2%10mL	他規格採用
アカルディカプセル 1.25mg	ピモベンダン錠 1.25mg 「TE」	販売中止
重カマ「ヨシダ」	酸化マグネシウム原末「マルイシ」	販売中止
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」 1mL/本	DT ビック 0.1mL/本	販売中止

・その他

- ① ジェノトロピンゴークイック注用 12mg の出荷保留に伴い、代替薬であるソマトロピン BS 皮下注 10mg 「サンド」 シュアパルの患者限定を解除し、限定申請書なしにオーダー可能とした。
- ② 細菌染色用ピオクタニンブルー1%溶液の当院における使用規定を作成した。
使用規定については、特に委員からの意見がなかったため、本規定で運用する。
- ③ 先発医薬品から後発医薬品への切り替えに際し、異議はなかったため後発医薬品へ変更する。(別紙①参照)
- ④ 定例の今年度不動薬リストを作成し、各診療科にアンケートを実施する。アンケート結果を次回薬事委員会で検討する。

新規試用医薬品

ルセンチス硝子体内注射液 10mg/mL 処方箋医薬品

(ノバルティスファーマ) 眼科用 VEGF 阻害剤

一般名：ラニビズマブ

効能効果：①中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症②網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫③病的近視における脈絡膜新生血管④糖尿病黄斑浮腫⑤未熟児網膜症

用法用量：①ラニビズマブ（遺伝子組換え）として 0.5mg (0.05mL) を 1 ヶ月毎に連続 3 ヶ月間（導入期）硝子体内投与する。その後の維持期においては、症状により投与間隔を適宜調節するが、1 ヶ月以上の間隔をあけること。

②③④ラニビズマブ（遺伝子組換え）として 1 回あたり 0.5mg (0.05mL) を硝子体内投与する。投与間隔は、1 ヶ月以上あけること。

⑤ラニズマブ（遺伝子組換え）として1回、0.2mg（0.02mL）を硝子体内投与する。なお、必要な場合は再投与できるが、1ヵ月以上の間隔をあけること。

処方区分：院内処方可

長期投与の可否：該当しない

薬価：160,698円/瓶

ボルヒール組織接着用5mL 処方箋医薬品 特定生物由来製品

（日本血液製剤機構）血漿分画製剤（生体組織接着剤）

一般名：フィブリノゲン加第XIII因子

効能効果：組織の接着・閉鎖（ただし、縫合あるいは接合した組織から血液、体液または体内ガスの漏出をきたし、他に適切な処置法のない場合に限る。）

用法用量：フィブリノゲン凍結乾燥粉末（バイアル1）をフィブリノゲン溶解液（バイアル2）全量で溶解し、A液とする。

トロンビン凍結乾燥粉末（バイアル3）をトロンビン溶解液（バイアル4）全量で溶解し、B液とする。溶解した両液の等容量を接着・閉鎖部位に重層又は混合して適用する。

通常、10cm²あたりA液B液各々1mLを適用する。

なお、接着・閉鎖部位の状態、大きさなどに応じて適宜増減する。

処方区分：院内処方可

長期投与の可否：可

薬価：52,925.9円

KN1号輸液500mL 処方箋医薬品

（大塚製薬工場）総合電解質輸液（開始液）

効能効果：脱水症及び病態不明時の水分・電解質の初期補給、手術前後の水分・電解質の補給

用法用量：通常成人、1回500～1000mLを点滴静注する。投与速度は通常成人1時間あたり300～500mL、小児の場合、1時間あたり50～100mLとする。なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。

処方区分：院内処方可

長期投与の可否：可

薬価：175円/袋

ベオーバ錠50mg 処方箋医薬品

（杏林製薬）選択的 β_3 アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

効能効果：過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁

用法用量：通常、成人にはビベグロンとして50mgを1日1回食後に経口投与する。

処方区分：院内・院外処方可

長期投与の可否：可

薬価：185.³円/錠

カーバゲル分散錠 200mg 処方箋医薬品

(レコルダティ・レア・ディーズ・ジャパン) 高アンモニア血症治療剤

効能効果：下記疾患による高アンモニア血症・N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症

イソ吉草酸血症、メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症

用法用量：通常、1日に体重kgあたり100mg～250mgより開始し、1日2～4回に分けて、用時、水に分散して経口投与する。その後は患者の状態に応じて適宜増減する。

処方区分：院内・院外処方可

長期投与の可否：可

薬価：16,596.⁹円/錠

トコフェロール酢酸エステル顆粒 20%「ツルハラ」 処方せん医薬品以外の医薬品

(鶴原製薬) ビタミンE剤

効能効果：1. ビタミンE欠乏症の予防及び治療

2. 末梢循環障害(間歇性跛行症、動脈硬化症、静脈血栓症、血栓性静脈炎、糖尿病性網膜症、凍瘡、四肢冷感症)

3. 過酸化脂質の増加防止

1. 以外の効能については、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきではない。

用法用量：通常、成人にはトコフェロール酢酸エステルとして1回50～100mgを、1日2～3回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

処方区分：院内・院外処方可

長期投与の可否：可

薬価：6.³円/g

リティンパ耳科用 250 μ gセット 処方箋医薬品

(ノーベルファーマ) 鼓膜穿孔治療剤

効能効果：鼓膜穿孔

用法用量：鼓膜用ゼラチンスポンジに100 μ g/mLトラフェルミン(遺伝子組換え)溶液全量を浸潤させて成形し、鼓膜穿孔縁の新鮮創化後、鼓膜穿孔部を隙間なく塞ぐように留置する。

処方区分：院内処方可

長期投与の可否：不可

薬価：32,691.³円/セット

後発医薬品への切り替えリスト

	先発品	後発品
1	アンカロン錠100	アミダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」
2	アンカロン注150	アミダロン塩酸塩静注150mg「TE」
3	オムブラル注用20	オムブラル注用20mg「NP」
4	ゲンタシン注10mg	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」
5	ゲンタシン注60mg	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」
6	ザイボックス錠600mg	リゾリド錠600mg「サワイ」
7	ザイボックス注射液600mg	リゾリド点滴静注液600mg「KCC」
8	セフゾンカプセル100mg	セフジニルカプセル100mg「JG」
9	セフゾン細粒小児用10%	セフジニル細粒小児用10%「JG」
10	セフメゾール静注用0.25g	セフメゾールNa静注用0.25g「NP」
11	セフメゾール静注用0.5g	セフメゾールNa静注用0.5g「NP」
12	セフメゾール静注用1g	セフメゾールNa静注用1g「NP」
13	注射用エフオーワイ100	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「効効」
14	パルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」
15	パルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」
16	プリパラン注射液10mg	塩酸メクロラムイド注射液10mg「効効」
17	プロスタンディン点滴静注用500μg	アルプロスタジルアルファデクス 点滴静注用500μg「効効」
18	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロールテープ1mg「HMT」
19	ホスミンS静注用0.5g	ホスホマイシンナトリウム静注用0.5g「日医工」
20	ホスミンドライシロップ ²⁰⁰	ホスホマイシンカルシウムドライシロップ ^{40%} 「日医工」
21	ホスミン錠500	ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」
22	メロペン点滴用バイアル0.25g	メロペム点滴静注用0.25g「明治」
23	メロペン点滴用バイアル0.5g	メロペム点滴静注用0.5g「明治」
24	モダシン静注用0.5g	セフタジジム静注用0.5g「マイラン」
25	モダシン静注用1g	セフタジジム静注用1g「マイラン」
26	ラジカット注30mg	エダロン点滴静注30mg/20mL「NP」 ※筋萎縮性側索硬化症（ALS）における機能障害 の進行抑制の適応なし
27	ラシックス注20mg	ラセピド注射液20mg「日医工」