


鼓室形成術クリニカルパス

| 経過 | 入院日 | 手術当日 | | 退院予定日 | 退院後 |
|-----|-------------------|---|--|---|---|
| | 手術前日 | 手術前 | 手術後 | 手術後1～3日目 | |
| 食事 | 夕食まで普通に食べることができます | ごはん、パンなどの固形食は食べられません 水分制限があります 水分は準備しています 飲水の種類・量を看護師と確認のうえ、水分表に記載します | 手術後2時間から水分開始 腸の動きを聴いてから水分開始です 目が覚めたら看護師が確認します | 制限はありません | 制限はありません |
| 安静 | なし | ベッド上安静 前投薬の内服前に排尿を済ませましょう 内服後はベッド上で過ごして下さい | トイレ歩行可 ふらつきに注意して、できるだけ病室内で安静に過ごしましょう | 病棟内安静 数日間は、ふらつきに注意しましょう 強く鼻をかんだり、鼻をすすらないようにしましょう 睡眠時、患部が下になって圧迫しないようにしましょう | 運動は次回外来受診以降にしましょう 通園・通学は、翌日より可能です 詳しくは主治医に確認して下さい 耳周囲を打撲しないよう注意しましょう |
| 保清 | なし | なし | なし | 清拭のみ 点滴除去後から患部がぬれないようにシャワー・入浴可能 | 患部がぬれないようにして入浴可能 |
| 創処置 | |  | 熱発・痛みが強い時 解熱鎮痛の坐薬を使用して症状を和らげます | 適宜ガーゼ交換 退院日は綿球で固定 | 綿球とテープを購入し、同じように固定し、汚染時は適宜交換しましょう 患側に1日2回(1回数滴)点耳をしましょう |
| 注射薬 | |  | 点滴 2日間 抗生剤点滴します | 手術後1日目の朝に点滴除去します |  |
| 内服薬 | | 前投薬 内服後は、ふらふらしたり眠たくなったりします 転倒・転落に注意しベッド上で静かに過ごします | 内服薬 3回/日 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①消炎鎮痛剤 ②整腸剤 |  ① ② | |