

# 合趾症手術クリニカルパス

経 過	手術前日	手術当日		手術後			退院
		手術前	手術後	1日	2日目	3～5日目	
食 事	夕食まで普通に食べることができます。	ごはん、パンなどの固形物は食べられません。  * 水分摂取制限があります。看護師にて説明します * 水分の種類、時間を看護師が確認します。	手術後2時間後より水分開始  * 看護師が腸の動きを確認してから水分開始です。 * 透明なものから始めます。嘔吐がなければ夕食や軽食を食べることができます。	普通に食べることができます。			
安 静	安静の制限はありませんが、なるべく病棟内で過ごします。	前投薬内服後は足元がふらつくのでベッド上で過ごします	ベッド上で過ごします  患部を包帯やギプスで固定しています 抱っこはできません		バギー、抱っこ、歩行可能、院内フリー  安静の制限はありませんが遊ぶ時は患部をぶつけないようにします。 歩行できる場合は、転倒・転落に注意します。		患部を濡らしたりぶつかけたり、また、包帯やギプスが外れたりしないように過ごします。  出血や汚染があれば早めにご連絡ください。
保 清				清拭・洗髪	清拭・洗髪	シャワー浴 (お子様の状態に合わせて患部を保護した上で行います。方法もご指導します。)	
創 部 処 置			痛みが強いとき、熱があるときは、医師の指示に従い、座薬や内服薬による痛み止めを使用します。				
注射薬			手術室で点滴をしたまま帰室します。 抗生剤を1～2回入れます。	点滴は継続します。 1日3回抗生剤の投与を行います。 発熱がなければ、夕方の抗生剤投与後、点滴を抜去します。			
内服薬		前投薬 * 眠たくなるお薬です。  服用後は転倒・転落に注意してベッド上で過ごします。			朝より抗生剤を内服します。 (1日3回)		退院処方があれば内服してください。