

多指症手術クリニカルパス

経 過	手術前日	手術当日		手術後			退院
		手術前	手術後	1日	2日目	3～5日目	
食 事	夕食まで普通に食べることができます。	ごはん、パンなどの固形物は食べられません。 * 水分摂取制限があります。看護師にて説明します。 * 水分の種類、時間を看護師が確認します。	手術後2時間後より水分開始 * 看護師が腸の動きを確認してから水分開始です。 * 透明なものから始めます。 嘔吐がなければ夕食や軽食を食べることができます。	普通に食べることができます。			
安 静	安静の制限はありませんが、なるべく病棟内で過ごします。	前投薬内服後は足元がふらつくのでベッド上で過ごします。	ベッド上で過ごします。 患部を包帯やギプスで固定しています。 抱っこはできません。		バギー、抱っこ、歩行可能、院内フリー 安静の制限はありませんが患部をぶつけないように注意します。		出血や汚染があれば早めにご連絡ください。 患部を濡らしたりぶつかけたり、また包帯やギプスが外れたりしないように過ごします。
保 清				清拭・洗髪	清拭・洗髪	シャワー浴 (お子様の状態に合わせて患部を保護した上で行います。方法をご指導します。)	
創 部 処 置			痛みが強いとき、熱があるときは、医師の指示に従い、座薬や内服薬をによる痛み止めを使用します。				
注射薬			手術室で点滴をしたまま帰室します。 抗生剤を1～2回入れます。	点滴は継続します。 1日3回抗生剤の投与を行います。 発熱がなければ、夕方の抗生剤投与後、点滴を抜去します。			
内服薬		前投薬 * 眠たくなるお薬です。 服用後は転倒・転落に注意してベッド上で過ごします。			朝より抗生剤を内服します。 (1日3回)		退院処方があれば内服してください。