

緊留解除術クリニカルパス

経 過	手術前日まで	手術当日		手術後1日	手術後2日	手術後3日	手術後4日～退院	退院後
		手術前	手術後					
食 事	夕食まで普通に食べることができます。	ごはん、パンなどの固形物は食べられません。 * 水分制限があります必ず看護師にご確認ください。 * 水分の種類、時間を確認の上、水分量を水分表に記載していきます。	手術後2時間後より水分を飲み始めます。 * 看護師が腸の動きを確認してから水分開始です。 * 透明なものから始めます。嘔吐がなければ夕食や軽食を食べることができます。					
安 静	病棟内で過ごします。 医師の指示があれば外泊できます。	ベッド上で過ごします。 * 排尿は前投薬までにすませます。 * 前投薬内服後は足元がふらつくのでベッド上でお過ごしください。	ベッド上です。 カテーテルや点滴を引っ張ったり、踏んだりしないよう注意していきます。	髄液漏予防のためベッド上で創部が上になるよううつぶせで過ごします。どうしても我慢できないときはご相談ください。		術後7日目で髄液漏がなければうつぶせをやめます。 医師の指示があれば尿道カテーテルも抜きます。 トイレや歩行ができて家に帰れる状態になれば退院となります。 抜糸は手術後2-3週間後に外来でします。		創部が開く恐れがあるのでダンス、サッカーなどの激しい運動は控えてください。
保 清	お風呂に入って体を洗います。	保清はありません。		体を拭きます。	保清はありません。	洗髪・入浴ができます。		
創 部 処 置			痛みが強いとき、熱があるときは、医師の指示に従い、座薬か内服薬を使用します。		医師の指示があれば、入浴時に創部のガーゼやテープを剥がします。 お子様が触らない場合は、何も貼らなくても大丈夫です。 触る場合は、再度ガーゼやテープを貼り保護します。		創部は清潔に保ってください。 万が一傷口が開いたり膿が出たりしたときにはすぐにご相談ください。	
処 置			SPO2モニターを付けます。	寝るときだけSPO2モニターを付けます。	処置はありません。			
点 滴			点滴が入っています。 1日3回抗生剤の投与を行います。			発熱がなければ点滴を抜きます。		
内服薬	前投薬 * 眠たくなるお薬です。 服用後は転倒・転落に注意してベッド上でお過ごしください。							

