

鼻涙管閉塞症クリニカルパス

経 過	入院日～手術前日	手術当日		手術後1日目～	退院後
		手術前	手術後	退院	
食 事	夕食までは普通に食べることができます 術前・術後の水分も準備しています	ごはん、パンなどの固形食は食べられません 飲水の種類・時間をご確認下さい 水分制限があります 必ず看護師と確認の上、飲水量を計測し、水分表に記載します	手術後2時間から飲水テスト開始 腸の動きを聴いてからの水分開始となります 看護師が声をかけます お茶か水かスポーツ飲料から開始 嘔吐がなければ夕食が食べられます	普通食 前日に水分が進んでいない時は水分から始めます	退院おめでとうございます 特に制限はありません
		病棟内	ベッド上安静 排尿は前投薬までに済ませておきます 内服後はベッド上で過ごします	トイレ歩行可 できるだけ病室内で安静に過ごしましょう 術後はガーゼ付きカップを装着します 両眼手術の場合は夕方に医師が片方を透明カップに変えます	病棟内 カップを外します 目を触ったり、こすったりしないよう注意します
入 浴	入院日はありません			入浴(首から下) バックシャンプー	退院後の入浴について 特に制限はありません
		術前検査(視力検査、眼の写真) 手術の説明(医師)		術後検査 診察(医師)	退院前の診察
点 眼	術後の眼拭用に清浄綿を退院までに購入して下さい		座薬の使用 発熱・痛みが強い時 解熱・鎮痛の座薬を使用して症状を和らげます	1日3回の点眼薬が始まります 点眼の方法を説明します 事前にパンフレットをお読み下さい 眼軟膏を使用する場合もあります	退院後の点眼 点眼を続けましょう 以後は外来受診の時に尋ね下さい
			手術室で点滴を入れて帰ってきます 術後の水分が順調にすすんだら、当日点滴を抜去できます	状態によっては点滴を翌日まで継続することもあります	
内服薬	前投薬	前投薬 内服後はふらふらしたり眠たくなったりします 転倒・転落に注意しベッド上で過ごします		適宜痛み止めの内服をしてください。	退院後の内服 適宜痛み止めの内服をして下さい。