


先天性耳瘻孔・副耳クリニカルパス

経過	手術前日	手術当日		手術後1日目	退院後
	入院	手術前	手術後	退院	
食事	夕食まで普通に食べることができます	ごはん、パンなどの固形食は食べられません 水分制限があります。水分は準備しています。飲水の種類・量を看護師と確認のうえ、水分表に記載します。	手術後2時間から水分開始 腸の動きを聴いてから水分開始です。目が覚めたら看護師が確認します。	普通食	食事の制限はありません。
安静	なし	ベッド上安静 前投薬の内服前に排尿を済ませましょう。内服後はベッド上で過ごして下さい。	トイレ歩行可 できるだけ病室内で安静に過ごしましょう。	病棟内自由 廊下を走ったりしないよう気をつけましょう。	通園・通学可
保清	なし	なし	なし	なし	入浴可、洗髪可 (創部はなるべく濡らさないようにしてください)
創処置			熱発・痛みが強い時 解熱鎮痛の坐薬を使用して症状を和らげます。	創はなるべく濡らさないようにしてください。	ガーゼや綿球がついたまま退院の場合は綿球、ガーゼやテープを購入し、同じように固定し、汚染時は適宜交換しましょう。
注射薬			点滴 2日間 輸液、抗生剤を1日2回点滴します	手術後翌日の朝の抗生剤終了後に点滴抜去	
内服薬		前投薬 内服後は、ふらふらしたり 眠たくなったりします。転倒・転落に注意しベッド上で過ごします。	内服薬 夕方より1日3回毎食後に鎮痛剤と整腸剤の内服を開始します。	抗生剤の内服を開始します。	内服続行 退院後もそのまま薬が無くなるまで飲み続けて下さい。