


包茎手術クリニカルパス

経過	手術前日	手術当日		手術後1日 退院
		手術前	手術後	
食事	夕食まで普通に食べることができます。	ごはん、パンなどの固形物は食べられません。 水分制限があります。 看護師と、水分の種類、時間を確認の上、水分量を水分表に記載します。	手術後2時間後より水分開始 看護師が腸の動きを確認してから水分開始です。 透明なものから始めます。嘔吐がなければ夕食や軽食を食べることができます。	特に制限はありません。
安静	病棟フリー	前投薬内服後は足元がふらつくのでベッド上でお過ごしください。	ベット上安静  創部の安静を保つために、ベットにチョッキを付けます。 チョッキをつけたままベットを90度まであげることができます。 必要に応じて安静度を変更します。 カテーテルや点滴を引っ張ったり、踏んだりしないよう注意します。	病棟フリー 退院翌日から通園・通学可能です。
保清		なし	なし	退院日は清拭・洗髪可能、 退院翌日より入浴可能です。
創部処置			創部周囲に包帯を巻いている場合もあります。 痛みが強いとき、熱があるときは、医師の指示に従い、座薬を使用します。	退院前に創部の包帯をはずし、創部を確認します。 退院後の注意事項に関しては、退院療養計画書を参照ください。
排尿・排便		手術前に浣腸を行います。	便秘時は浣腸や緩下剤の内服を行います。	カテーテル抜去後、排尿状態の観察を行います。
注射薬			手術室で点滴を確保して帰室します。	発熱がなければ点滴を抜去します。
内服薬		前投薬 *眠たくなるお薬です。 転倒・転落に注意し、ベッド上で静かに過ごします。		ありません。