

斜視手術クリニカルパス

経過	入院日	手術当日		手術後1日目・退院	退院後
		手術前	手術後		
食事	夕食までは普通に食べることができます 術前・術後の水分も準備しています	ごはん、パンなどの固形食は食べられません 飲水の種類・時間をご確認下さい 水分制限があります 必ず看護師と確認の上、飲水量を計測し、水分表に記載します	手術後2時間から飲水テスト開始 腸の動きを聴いてからの水分開始となります 看護師が声をかけます お茶またはスポーツ飲料から開始 嘔吐がなければ夕食が食べられます	普通食 前日に水分が進んでいないときは水分から始まります	退院おめでとうございます
					特に制限はありません
安静	病棟内	ベッド上安静 排尿は前投薬までに済ませておきます 前投薬内服後はベッド上で過ごします	トイレ歩行可 できるだけ病室内で安静に過ごしましょう 術後はガーゼ付きカッペを装着します 両眼手術の場合は夕方に片眼を透明カッペにかえます	病棟内 カッペを外します 目を触ったり、こすったりしないよう注意します	退院後の日常生活
					目を打ったりしないように気をつけて下さい かけっこは1週間後 ボール遊びは2週間後 プールは1ヵ月後
入浴	入院日は入浴はありません	手術日は入浴はありません		入浴(首から下) バックシャンプー	退院後の入浴について
					入浴可(首から下) 但しバックシャンプーで 術後2週間後～洗顔・シャンプー可
検査	術前検査(視力検査、眼の写真) 手術の説明(医師)		術後検査 診察(医師)	退院前の診察	外来受診
					外来にて診察があります
点眼	術後の眼拭用に清浄綿を退院までに購入して下さい			1日3回の点眼薬が始まります 点眼の方法を説明いたします 事前にパンフレットをお読み下さい	退院後の点眼
					点眼を続けましょう 以後は外来受診の時に尋ね下さい
点滴			手術室で点滴を入れて帰ってきます 術後の水分が順調にすすみ、夕食を食べることができたら点滴を抜去します	状態によっては点滴を翌日まで継続することもあります	
内服薬		前投薬(眠くなる薬)がある場合 内服後はふらふらしたり眠たくなったりします 転倒・転落に注意しベッド上で過ごします	発熱時や痛みが強い時は、解熱鎮痛剤を使用し症状を和らげます	発熱時や痛みが強い時は、解熱鎮痛剤を使用し症状を和らげます	退院後の内服
					退院処方はありません