


眼瞼内反症手術クリニカルパス

経過	入院日	手術当日		術後1日・退院	退院後
	手術前日	手術前	手術後		
食事	夕食までは普通に食べることができません 術前術後の水分も準備しています	ごはん、パンなどの固形食は食べられません 水分制限があります 飲水の種類・時間をご確認ください 必ず看護師と確認の上、飲水量を計測し、水分表に記載します	手術後2時間から飲水テスト開始 腸の動きを聞いてからの水分開始となります 看護師が声をかけます お茶またはスポーツ飲料から開始 嘔吐がなければ夕食が食べられます	普通食 前日に水分が進んでいない時は水分から始まります	特に制限はありません
安静	病棟内	ベッド上安静 排尿は前投薬までに済ませておきます 内服後はベッド上で過ごします	トイレ歩行可 できるだけ病棟内で安静に過ごしましょう 術後はガーゼ付きカッペを装着します 両眼手術の場合は夕方に片眼を透明カッペにかえます	病棟内 カッペを外します 目を触ったり、こすったりしないように注意します	目を打ったりしないように気を付けてください かけこは1週間後 ボール遊びは2週間後 プールは1ヶ月後
入浴	入院日は入浴はありません	手術日は入浴はありません		退院後に入浴可(首から下) バックシャンプー	入浴可(首から下) バックシャンプー 術後2週間後から 洗顔・シャンプー可
検査	術前検査(視力検査、眼の写真) 手術の説明(医師)		術後検査・診察(医師)	退院前の診察	外来にて抜糸・診察があります
点眼	術後の眼拭き用に清浄綿を退院までに購入して下さい			1日3回の点眼薬と1日2回の眼軟膏が始まります 点眼・眼軟膏(カットバンの貼付)の方法を説明いたします 事前にパンフレットをお読み下さい	点眼・眼軟膏を続けましょう 以降は外来受診の時に尋ね下さい
注射			手術室で点滴を入れて帰ってきます 術後の水分が順調にすすんだら点滴を抜去できます	状態によっては点滴を翌日まで継続することもあります	
内服		前投薬(眠くなる薬)がある場合 前投薬内服後はふらふらしたり眠くなったりします 転倒・転落に注意してベッド上で過ごします	発熱時や痛みが強い時は、解熱鎮痛剤を使用し症状を和らげます	発熱時や痛みが強い時は、解熱鎮痛剤を使用し症状を和らげます	退院処方はありません