





扁桃摘出術クリニカルパス

経過	手術前日	手術当日		手術後1～2日目	手術後3～5日目
		手術前	手術後	* 退院	退院
食事	夕食まで普通に食べることができます	ごはん、パンなどの固形食は食べられません 水分制限があります 水分は準備しています 飲水の種類・量を看護師と確認のうえ、水分表に記載します	手術後2時間から水分開始 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 腸の動きを聴いてから水分開始です 目が覚めたら看護師が確認します 水分摂取して嘔吐なければ 夕食～全粥5分粥菜	全粥5分粥菜食 食事摂取可能になればでき 軟飯やうどん食に変更できます	
安静	なし	ベッド上安静 前投薬の内服前に排尿を済ませましょう 内服後はベッド上で過ごして下さい	トイレ歩行可 できるだけ病室内で安静に過ごしましょう	病棟内安静 廊下を走ったり、強く鼻をかんだりしないように にしましょう	病棟内自由
保清	なし	なし	なし	清拭のみ	シャワー浴・洗髪 (ぬるま湯)
創処置			熱発・痛みが強い時 解熱鎮痛の坐薬を使用して症状を和らげ ます	うがい 5回/日 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (起床時、毎食後、眠前) 喉は消毒することができません 食後はしっかり歯磨き、うがいをしましょう	 歯ブラシで喉をつかないよう 注意しましょう
注射薬			点滴 3日間 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 止血剤入りの輸液 抗生剤点滴	 抗生剤点滴は手術後1日目の朝で終了です 食事が順調なら手術後2日に点滴除去	
内服薬		前投薬 内服後は、ふらふらしたり 眠たくなったり します 転倒・転落に注意し、ベッド上で静かに過 ごします	内服薬(タより) 3回/日 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①消炎鎮痛剤 ②整腸剤 嚥下痛ある時は、食前に内服します	 ① ②	①