

# 胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術クリニカルパス

経過	入院日	手術当日		術後1～14日	退院後
	手術前日	手術前	手術後		
食事	特に制限はありません	朝:軽食とおにぎり 以後は絶食です 水分は手術予定の2時間前まで摂取できます	水分:手術後2時間経過後、水分摂取 できます。 食事:夕食または翌日朝食から普通食	以後 普通食	
安静	安静度2 安静度表にそって説明があります		安静度3 翌日朝までベッド上で安静	術後1日目 医師の診察後歩行が可能 となります 安静度2～3(子宮収縮の有無などにより 決定します。)	特に制限はありません
保清	シャワー可		シャワー不可	術後1日目 スタッフで清拭を行います 術後2日目以降 シャワー可	シャワー可
診察検査	超音波検査		帰室後 心電図モニターをつけます 出血の有無や子宮収縮など観察します	術後1日目 診察と超音波検査, 採血検査 術後4日目 診察と抜糸 術後5日目 採血検査 その後も適宜 超音波検査を行います  術後3日目までは一日3回体温、血圧測 定をお願いします	退院日に次回予約表をお渡 しします 前医へ受診の場合、紹介状 等をお渡します
注射内服		術前2時間前後より点滴を開始します		術後1日目 医師の診察後、点滴終了 術後の状態によっては内服薬が処方さ れる場合もあります	当院の外来受診や前医の受 診までに子宮収縮や出血な どみられたら病院へ連絡をし てください
その他	病棟オリエンテーション 術前オリエンテーション	弾性ストッキングをはきます		弾性ストッキングは術後1日目の診察 後、歩行が可能となるまで はいてくだ さい	